© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

HYBRIDEN IN DER SEKTION AURICULASTRUM DER GATTUNG PRIMULA, MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON ARTIFIZIELLEN BASTARDEN.

F. KUMMERT, Wohngraben

Die Sektion Auriculastrum bildet mit den Sektionen Cuneifolia und Parryi das Subgenus Auriculastrum und umfaßt 21, nur in Europa heimische Arten. Seit Heinrich Wilhelm SCHOTT gibt es eine Einteilung der Sektion in Subsektionen, die sich mit wenigen Änderungen bis heute gehalten hat.

Subsektion Euauricula: P. auricula L., P. palinuri PETAGNA
Subsektion Brevibracteatae: P. carniolica JACQ., P. latifolia LAPEYR., P. marginata CURTIS
Subsektion Erythrodrosum: P. apennina WIDMER, P. daonensis (LEYBOLD) LEYBOLD, P. hirsuta ALL., P. pedemontana THOMAS ex GAUDIN, P. villosa WULFEN in JACQ.
Subsektion Arthritica: P. clusiana TAUSCH, P. glaucescens MORETTI, P. spectabilis TRATTINICK, P. wulfeniana SCHOT
Subsektion Rhopsidium: P. allionii LOISEL., P. integrifolia L., P. kitaibeliana SCHOTT, P. tyrolensis SCHOTT
Subsektion Cyanopsis: P. deorum VELEN., P. glutinosa WULFEN in JACQ.
Subsektion Chamaecallis: P. minima L.

Bedingt durch die vielen bekannten Bastarde in dieser Sektion und die vielen Sammler, welche sich mit ihnen befaßten, ist naturgemäß eine große Anzahl von binären Namen veröffentlicht worden. Für die mir bekannten 41 Kombinationen ist die Anzahl der veröffentlichten Namen rund um die 200. Eine Anzahl von ihnen ist nach den nomenklatorischen Regeln ungültig. Die meisten jedenfalls sind zu überprüfen und einige wenige sind bereits so gut überprüft worden, daß wir annehmen können, daß sie auch weiterhin angewendet werden können.

Die folgende Übersicht gliedert die Bastarde in drei Gruppen:
1. Naturbastarde
2. Gärtnerische Bastarde
3. Zweifelhafte Bastarde

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1. Naturbastarde

P. auricula x P. carniolica	P. x venusta HOST
P. auricula x P. daonensis	P. x discolor LEYBOLD
P. auricula x P. hirsuta	P. x pubescens JACQ.
P. auricula x P. clusiana	P. x lempergii F. BUXB.
P. auricula x P. integrifolia	P. x escheri BRÜGGER
P. auricula x P. tyrolensis	P. x obovata HUTER
P. latifolia x P. marginata	P. x crucis BOWLES ex FARRER
P. latifolia x P. daonensis	P. x kolbiana WIDMER
P. latifolia x P. hirsuta	P. x berninae KERNER
P. latifolia x P. pedemontana	P. x bowlesii FARRER
P. latifolia x P. integrifolia	P. x muretiana MORITZI
P. daonensis x P. hirsuta	P. x seriana WIDMER
P. daonensis x P. minima	P. x pumila KERNER
P. hirsuta x P. integrifolia	P. x heerii BRÜGGER
P. hirsuta x P. minima	P. x forsteri STEIN
P. villosa x P. minima	P. x truncata LEHMANN
P. clusiana x P. minima	P. x intermedia PORTENSCHLAG
P. glaucescens x P. spectabilis	P. x caruelii PORTA
P. spectabilis x P. minima	P. x facchinii SCHOTT
P. wulfeniana x P. tyrolensis	P. x venzoides VENZO
P. wulfeniana x P. minima	P. x vochinensis GUSMUS
P. tyrolensis x P. minima	P. x juribella SÜNDERMANN
P. glutinosa x P. minima	P. x floerkeana SCHRAD.

Mir unklar ist noch eine Sippe, welche sich in den Verbreitungsgebieten der P. pedemontana und P. villosa (P. cottia) findet und die als Kreuzung dieser beiden gedeutet werden könnte.

2. Gärtnerische Bastarde

P. auricula x P. latifolia	P. x widmeriana SÜNDERMANN, Hort. SÜNDERMANN
P. auricula x P. marginata	P. x salomonii SÜNDERMANN, Hort. SÜNDERMANN
P. auricula x P. pedemontana	P. x sendtneri WIDMER, Hort.Nymphenburg, KELLERER
P. auricula x P. villosa	wahrscheinlich P. x hybrida KNAF, an verschiedenen Orten, auch bei mir, ungeklärt!

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

P. auricula x P. allionii	P. x loiseleurii SÜNDERMANN, Hort. SÜNDERMANN
P. auricula x P. kitaibeliana	P. x advena, Hort.KUMMERT
P. marginata x P. villosa	P. x elisabethae SÜNDERMANN, Hort. SÜNDERMANN
P. marginata x P. allionii	P. 'Fairy Rose' u.a.Sorten, in englischen Gärten
P. hirsuta x P. villosa	P. x multiciliata, Hort. KUMMERT
P. hirsuta x P. allionii	P. 'Ethel Barker', Hort. BARKER
P. villosa x P. allionii	P. x mauerbachii, Hort. KUMMERT
P. glaucescens x P. minima	P. x praedicta, Hort.KUMMERT
P. kitaibeliana x P. minima	P. x pulcherrima, Hort. KUMMERT

Die Auffindung gärtnerischer Bastarde ist besonders schwierig, da die wenigsten Gärtner, ausgenommen die großen Züchter und Kultivateure Sündermann, Arends und Foerster, etwas über ihre Ergebnisse veröffentlichten. Es ist als sicher anzunehmen, daß außer den angeführten 13 Kombinationen, die mir bekannt geworden sind, noch andere irgendwo erzogen worden sind. Ich bin jedenfalls für jeden Kommentar zu diesem Problemkreis dankbar.

3. Zweifelhafte Bastarde

P. auricula x P. spectabilis	P. x weldeniana DALLA TORRE et SARNTH
P. auricula x P. wulfeniana	P. x lebliana GUSMUS
P. hirsuta x P. glaucescens	
P. glaucescens x P. integrifolia	
P. integrifolia x P. glutinosa	P. huegeninii BRÜGGER